

Pripravila: Mateja Rok Simon
Ljubljana, 10.12.2012

MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 19. POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE POSLEDICE ZUNANJIH VZROKOV (S00–T98)

POŠKODBE SPLOŠNO

NOVO: *Podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za bolj podrobno označitev vrste ali lokalizacije poškodbe.*

Primer:

S00 Površinska poškodba glave

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematom
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

Primer:

S01.2 Rana na nosu

- ⊗ S01.20 Rana na nosu, neopredeljen del, neopredeljena
- ⊗ S01.21 Rana na nosu, kožna rana
- ⊗ S01.22 Rana na nosu, nosnici
- ⊗ S01.23 Rana na nosu, pretin
- ⊗ S01.29 Rana na nosu, rane na različnih delih nosu

ZNOTRAJLOBANJSKE POŠKODBE

NOVO: *Za kakršno koli pridruženo izgubo zavesti pri podkategorijah S06.1–S06.9 (Znotrajlobanjska poškodba) uporabimo dopolnilno kodo (S06.01–S06.05).*

Primer:

S06 Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba

- ⊗ S06.01 Izguba zavesti neopredeljenega trajanja
- ⊗ S06.02 Izguba zavesti kratkotrajna (manj kot 30 minut)
- ⊗ S06.03 Izguba zavesti, zmernega trajanja (30 minut do 24 ur)
- ⊗ S06.04 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , s povrnitvijo prvotnega stanja zavesti
- ⊗ S06.05 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , brez povrnitve prvotnega stanja zavesti

Zato so izbrisane nekatere kode MKB-10: npr. S06.7 (Znotrajlobanjska poškodba z dolgotrajno komo)

Dopolnilna koda: Za določitev odprte znotrajlobanjske poškodbe [odprta rana, ki komunicira z znotrajlobanjsko poškodbo] pri kategoriji S06 uporabimo dopolnilno kodo za odprto rano S01.83.

POŠKODBE HRBTENICE

Dopolnilna koda: Za opis izpaha povezanega z zlomom vretenca uporabimo dopolnilno kodo izpaha. Najprej kodiramo zlom (S82.-, S92.-), izpah (S93.0–S93.3-), dodatno rano. Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodiramo zlom na najvišjem nivoju.

Dopolnilna koda: Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabimo dopolnilno kodo za odprto rano.

NOVO: Najprej kodiramo vrsto poškodbe hrbtenjače, dodatno kodiramo tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače.

Primer:

⊗S14.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga

- ⊗S14.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, neopredeljen
- ⊗S14.71 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C1
- ⊗S14.72 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C2
- ⊗S14.73 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C3
- ⊗S14.74 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C4
- ⊗S14.75 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C5
- ⊗S14.76 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C6
- ⊗S14.77 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C7
- ⊗S14.78 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C8

POŠKODBE NOTRANJIH ORGANOV

NOVO: Za določitev odprte poškodbe notranjih organov [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem ali trebušno votlino] uporabimo dopolnilno kodo za odprto rano. Najprej kodiramo intratorakalno poškodbo oz. intraabdominalno poškodbo (S26–S27, S36–S37).

Primer:

S26 Poškodba srca

- ⊗S21.83 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira s prsno votlino

POŠKODBE ROKE, NOGE (S40–S99)

Dopolnilna koda: Najprej kodiramo zlom, nadalje izpah, potem dodatno rano.

Primer:

⊗S91.8 Druge rane gležnja in stopala

⊗S91.81 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S82.-, S92.-).

⊗S91.82 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S93.0–S93.3-).

POŠKODBE, KI ZAJEMAJO VEČ TELESNIH PODROČIJ (REGIJ) (T00–T07)

Odprt/zaprt zlom se kodira na četrtem oz. petem mestu s podkategorijami T02, T08, T10, T12, T14.2, enako kot v MKB 10.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

0 zaprt

1 odprt

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) (T20–T31)

NOVO: Namesto 1., 2., 3. stopnje opekline, se uporablja globina opekline.

Primer:

T20 Opekline in korozija (kemična opekline) glave in vratu

T20.0 Opekline neopredeljene stopnje na glavi in vratu

T20.1 Epidermalna opeklinska rana glave in vratu

T20.2 Povrhnja dermalna opeklinska rana glave in vratu

T20.3 Subdermalna opeklinska rana glave in vratu

NOVO: Podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za bolj podrobno označitev lokalizacije opekline.

Primer:

T21.0 Opekline neopredeljene stopnje na trupu

- ⊗ 0 na trupu, neopredeljena lokacija
- ⊗ 1 na dojki
- ⊗ 2 na steni prsnega koša, izključena dojka
- ⊗ 3 na trebušni steni
- ⊗ 4 na hrbtu
- ⊗ 5 spolovilih
- ⊗ 9 na drugih neopredeljenih mestih na trupu

T31 Opekline, uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine

Dopolnilna koda: Ta kategorija naj se uporablja kot dopolnilna koda poleg kategorij T20–T25, T29.

Naslednje podrazdelitve petega znaka naj se uporabljajo s sklopom T31 za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ⊗ 0 manj kot 10 % ali neopredeljeno
- ⊗ 1 10–19%
- ⊗ 2 20–29%
- ⊗ 3 30–39%
- ⊗ 4 40–49%
- ⊗ 5 50–59%
- ⊗ 6 60–69%
- ⊗ 7 70–79%
- ⊗ 8 80–89%
- ⊗ 9 90 % ali večja površina telesa

Koda T32 (Korozije , uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine) se ne uporablja več.

TOKSIČNI UČINKI SNOVI PREDVSEM NEMEDICINSKEGA IZVORA (T51–T65)

T63 Toksični učinek stika s strupenimi živalmi

Dopolnilna koda: Po potrebi uporabimo dopolnilno kodo za določitev reakcij, kot so:

- alergična reakcija BDO (T78.4)
- anafilaksija (T78.2)
- urtikarija (L50.0, T78.3)

DRUGI TRAVMATOLOŠKI ZAPLETI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T89)

NOVO: Če želimo opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabimo dopolnilno kodo T89.0. Najprej kodiramo mesto rane.

⊗T89 Drugi opredeljeni travmatološki zapleti

⊗T89.0 Zapleti zaradi ran

⊗T89.00 Neopredeljeni zapleti zaradi ran

⊗T89.01 Zapleti zaradi tujkov (z ali brez okužbe)

⊗T89.02 Okužena rana

⊗T89.03 Drugi zapleti zaradi ran