



## **2 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA**



## 2.1 UMRLJIVOST

V letu 2017 je umrlo 20.509 prebivalcev Slovenije, od tega 10.136 moških in 10.373 žensk oziroma 820 prebivalcev več (4,2 %) kot v preteklem letu. Stopnja umrljivosti je v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji in EU upadala. Povprečna starost umrlih se zvišuje. Tako so v povprečju moški doživelji 74, ženske pa več kot 81 let starosti.

Podatki o umrljivosti sodijo med najbolj zanesljive podatke zdravstvene statistike in so osnova za izračun nekaterih kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva. Skupaj z drugimi pomembnimi kazalniki predstavljajo temelj za načrtovanje zdravstvenega varstva in zdravstvene politike v državi.

Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije so še vedno bolezni obtočil (med najpogosteje sodijo srčni infarkt, možganska kap, odpoved srca in druge) ter neoplazme (rak prebavil, prostate, dojke in pljuč), ki so bile v letu 2017 vzrok 70 % vseh smrti. Sledijo poškodbe, zastrupitve in drugi zunanji vzroki ter bolezni dihal in prebavil. Glede na spol pa od leta 2009 dalje pri moških bolezni srca in ožilja celo niso več najpogostejsi vzrok smrti, temveč so na drugem mestu, za neoplazmami.


V letu 2017 je 1.535 prebivalcev umrlo zaradi posledic zunanjih vzrokov obolevnosti in smrti. Zaradi padcev je umrlo 680 prebivalcev (44,3 %), zaradi samomora 411 prebivalcev (26,8 %), zaradi transportnih nezgod 116 prebivalcev (7,6 %), zaradi napada 23 prebivalcev (1,5 %) ter 305 prebivalcev (19,9 %) zaradi ostalih zunanjih vzrokov smrti.

Umrljivost dojenčkov je pomemben kazalnik kakovosti zdravstvenega varstva ter vpliva drugih determinant zdravja in kulture prebivalstva. V letu 2017 je v Sloveniji umrlo 42 dojenčkov. V zadnjem desetletju se stopnja umrljivosti dojenčkov znižuje.


2.1 Slika 1: **Vodilna vzroka smrti po spolu**, Slovenija, 2008–2017

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev

### Moški



### Ženske



Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)


Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 2: **Umrli in povprečna starost umrlih**, Slovenija, 2017

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti


2.1 Slika 3: **Povprečna starost ob smrti** po spolu, Slovenija, 1988–2017

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

Povprečna starost umrlih se zvišuje. Tako so v povprečju moški doživelji 74, ženske pa več kot 81 let starosti.

2.1 Slika 4: **Povprečna starost ob smrti** po spolu, Slovenija, 1997 in odmik od 1988, 2007 in odmik od 1998, 2017 in odmik 2008

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 1: **Umrli in stopnja umrljivosti** po spolu, Slovenija, 2008–2017

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Število umrlih</b>											
SKUPAJ	Moški	9.174	9.293	9.292	9.235	9.412	9.555	9.208	9.739	9.673	10.136
	Ženske	9.134	9.457	9.317	9.464	9.845	9.779	9.678	10.095	10.016	10.373
	<b>SKUPAJ</b>	<b>18.308</b>	<b>18.750</b>	<b>18.609</b>	<b>18.699</b>	<b>19.257</b>	<b>19.334</b>	<b>18.886</b>	<b>19.834</b>	<b>19.689</b>	<b>20.509</b>
0-64 let	Moški	2.977	2.862	2.855	2.716	2.752	2.705	2.478	2.590	2.487	2.398
	Ženske	1.193	1.177	1.165	1.206	1.223	1.191	1.097	1.127	1.079	1.141
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.170</b>	<b>4.039</b>	<b>4.020</b>	<b>3.922</b>	<b>3.975</b>	<b>3.896</b>	<b>3.575</b>	<b>3.717</b>	<b>3.566</b>	<b>3.539</b>
<b>Stopnja umrljivosti</b> na 100.000 prebivalcev											
SKUPAJ	Moški	906,3	918,5	915,7	909,5	925,1	937,1	901,5	952,4	944,7	987,9
	Ženske	889,3	917,7	900,6	912,6	947,7	940,8	930,4	970,2	962,7	997,2
	<b>SKUPAJ</b>	<b>897,7</b>	<b>918,1</b>	<b>908,1</b>	<b>911,0</b>	<b>936,5</b>	<b>938,9</b>	<b>916,1</b>	<b>961,4</b>	<b>953,8</b>	<b>992,6</b>
0-64 let	Moški	342,9	325,4	324,2	308,6	313,5	308,9	283,9	298,3	288,1	278,9
	Ženske	144,8	142,5	140,5	145,1	147,4	143,9	133,1	137,4	132,3	140,7
	<b>SKUPAJ</b>	<b>246,4</b>	<b>236,8</b>	<b>235,1</b>	<b>229,2</b>	<b>232,8</b>	<b>228,7</b>	<b>210,6</b>	<b>220,1</b>	<b>212,4</b>	<b>211,8</b>
<b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> na 100.000 prebivalcev											
SKUPAJ	Moški	844,3	830,3	800,1	774,9	763,9	748,1	697,7	717,3	692,2	700,9
	Ženske	472,0	469,2	448,4	442,4	443,7	428,4	409,5	420,2	404,3	412,7
	<b>SKUPAJ</b>	<b>631,9</b>	<b>625,1</b>	<b>599,7</b>	<b>585,4</b>	<b>582,2</b>	<b>569,2</b>	<b>536,3</b>	<b>552,2</b>	<b>533,5</b>	<b>538,9</b>
0-64 let	Moški	301,9	286,5	277,0	258,7	257,1	251,1	226,0	238,0	229,5	217,9
	Ženske	125,4	122,1	118,7	118,6	117,6	114,5	104,2	106,6	102,8	107,9
	<b>SKUPAJ</b>	<b>214,7</b>	<b>205,3</b>	<b>198,8</b>	<b>189,6</b>	<b>188,3</b>	<b>183,8</b>	<b>166,1</b>	<b>173,3</b>	<b>167,0</b>	<b>163,6</b>

Vir:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

WHO European Data Warehouse, <http://data.euro.who.int/hfadb>, 9. 1. 2018, za obdobje 2008–2010 in Obrazec Prijava smrti (DEM-2) za obdobje 2011–2017, za podatke Starostno standardizirana stopnja umrljivosti

2.1 Tabela 2: **Umrli dojenčki** po spolu, Slovenija, 2008–2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Število umrlih dojenčkov</b>										
Dečki	30	25	24	41	18	32	19	18	20	21
Deklice	22	27	32	23	18	30	20	15	21	21
<b>SKUPAJ</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
<b>Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih otrok</b>										
Dečki	2,7	2,2	2,1	3,6	1,6	3,0	1,8	1,7	2,0	2,0
Deklice	2,1	2,6	3,0	2,1	1,7	3,0	2,0	1,5	2,1	2,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

Viri:


Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

Perinatalni informacijski sistem

2.1 Slika 5: **Umrli dojenčki** po spolu, Slovenija, 1985–2017

na 1.000 živorojenih otrok



Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

Perinatalni informacijski sistem

2.1 Tabela 3: **Umrli in starostno specifična stopnja umrljivosti** po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2017

	<b>Število umrlih</b>			<b>Starostno specifična stopnja umrljivosti</b> na 100.000 preb.		
	Moški	Ženske	<b>SKUPAJ</b>		Moški	Ženske
0-9 let	26	28	54	23,5	26,8	25,1
10-19	17	12	29	17,6	13,2	15,5
20-29	72	26	98	62,5	24,2	44,0
30-39	123	46	169	79,3	32,8	57,2
40-49	272	143	415	175,2	99,3	138,7
50-59	948	448	1.396	618,0	298,0	459,6
60-69	2.032	991	3.023	1.521,9	721,6	1.116,1
70-79	2.603	1.782	4.385	3.614,0	1.914,7	2.656,1
80-89	3.214	4.339	7.553	10.352,7	7.141,1	8.227,1
90+	829	2.558	3.387	26.367,7	21.659,6	22.649,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.136</b>	<b>10.373</b>	<b>20.509</b>	<b>987,9</b>	<b>997,2</b>	<b>992,6</b>

© NIJZ


Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)


Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 6: **Umrli 0–64 let (prezgodnja umrljivost)**, Slovenija, 2016

Pred 65. letom starosti je v Sloveniji umrlo 3.539 oseb (17 % od vseh umrlih):  
68 % moških in 32 % žensk.



Vodilni vzroki prezgodnje umrljivosti so enaki pri obeh spolih.




Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 7: **Umrli 0–64 let po spolu**, Slovenija, 2008–2017

na 100.000 prebivalcev starostne skupine



Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 4: **Umrli in stopnja umrljivosti** po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2017

Poglavje MKB-10		Število umrlih			Stopnja umrljivosti na 100.000 preb.			
		Moški	Ženske	SKUPAJ				
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00-B99	41	72	113	4,0	6,9	5,5
II.	Neoplazme	C00-D48	3.537	2.824	6.361	344,7	271,5	307,9
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv	D50-D89	7	10	17	0,7	1,0	0,8
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E90	182	205	387	17,7	19,7	18,7
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	298	70	368	29,0	6,7	17,8
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	287	333	620	28,0	32,0	30,0
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	-	-	-	-	-	-
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H59	1	-	1	0,1	-	0,0
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	3.302	4.702	8.004	321,8	452,0	387,4
X.	Bolezni dihal	J00-J99	628	652	1.280	61,2	62,7	62,0
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	508	404	912	49,5	38,8	44,1
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	4	5	9	0,4	0,5	0,4
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	20	59	79	1,9	5,7	3,8
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	87	190	277	8,5	18,3	13,4
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	-	-	-	-	-	-
XVI.	Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	11	13	24	1,1	1,2	1,2
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00-Q99	19	19	38	1,9	1,8	1,8
XVIII.	Ssimptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00-R99	286	198	484	27,9	19,0	23,4
XX.	Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti	V01-Y98	918	617	1.535	89,5	59,3	74,3
<b>SKUPAJ</b>			<b>10.136</b>	<b>10.373</b>	<b>20.509</b>	<b>987,9</b>	<b>997,2</b>	<b>992,6</b>

Viri:


Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 5: **Umrli** po vrsti poškodbe, zastrupitve in nekaterih drugih posledic zunanjih vzrokov (MKB-10, poglavje XIX) in po spolu, Slovenija, 2017

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov po MKB-10		Število umrlih		
		Moški	Ženske	SKUPAJ
Poškodbe glave	S00-S09	127	74	201
Poškodbe vratu	S10-S19	21	9	30
Poškodbe prsnega koša	S20-S29	21	15	36
Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice	S30-S39	12	17	29
Poškodbe rame in nadlakti	S40-S49	1	8	9
Poškodbe komolca in podlakti	S50-S59	4	4	8
Poškodbe zapestja in roke	S60-S69	4	2	6
Poškodbe kolka in stegna	S70-S79	124	244	368
Poškodbe kolena in goleni	S80-S89	2	13	15
Poškodbe skočnega sklepa in stopala	S90-S99	1	-	1
Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij	T00-T07	114	58	172
Poškodbe na neopredeljenem delu trupa, uda ali telesnega področja	T08-T14	1	-	1
Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino	T15-T19	14	20	34
Opeklne in korozije (kemične opeklne)	T20-T32	11	3	14
Ozeblina	T33-T35	-	-	-
Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi	T36-T50	54	27	81
Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora	T51-T65	58	10	68
Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov	T66-T78	233	55	288
Določeni zgodnji zapleti poškodbe	T79	2	-	2
Zapleti kirurske in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje	T80-T88	42	40	82
Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov	T90-T98	15	7	22
<b>SKUPAJ</b>		<b>861</b>	<b>606</b>	<b>1.467</b>

Viri: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smerti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 8: **Vodilni vzroki smrti** po spolu, Slovenija, 2017

Viri: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smerti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 6: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti** zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2017

Poglavlje MKB-10		SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev		
		Moški	Ženske	SKUPAJ
Bolezni obtočil	I00-I99	222,4	153,1	184,9
Neoplazme	C00-D48	240,9	142,1	182,5
Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti	V01-Y98	70,8	27,8	48,0
Bolezni dihal	J00-J99	41,4	21,9	28,8
Bolezni prebavil	K00-K93	35,7	15,9	25,0


© NIJZ

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

V letu 2017 so bile, kot najpogostejši vzrok smrti, pri ženskah na prvem mestu bolezni obtočil, na drugem mestu pa neoplazme, pri moških je bilo stanje obratno. V razvitih državah se deleža teh dveh glavnih vzrokov smrti v zadnjih letih izenačujeta, ponekod pa so neoplazme že pogostejši vzrok smrti kot bolezni obtočil.

2.1 Slika 9: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti** po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2008–2017

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 7: **Umrli in stopnja umrljivosti** po zunanjih vzrokih obolenosti in umrljivost (MKB-10, poglavje XX) in spolu, Slovenija, 2017

<b>Zunanji vzroki obolenosti in umrljivost po MKB-10<sup>1)</sup></b>		<b>Število umrlih</b>			<b>Stopnja umrljivosti</b> na 100.000 prebivalcev		
		Moški	Ženske	SKUPAJ	Moški	Ženske	SKUPAJ
Pešec, poškodovan v transportni nezgodi	V01-V09	5	7	12	0,5	0,7	0,6
Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	V10-V19	13	2	15	1,3	0,2	0,7
Motorist, poškodovan v transportni nezgodi	V20-V29	27	2	29	2,6	0,2	1,4
Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi	V40-V49	27	18	45	2,6	1,7	2,2
Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi	V50-V59	1	-	1	0,1	-	0,0
Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi	V60-V69	3	-	3	0,3	-	0,1
Druge nezgode med transportom po kopnem	V80-V89	9	-	9	0,9	-	0,4
Nezgode med transportom po zraku in v vesolju	V95-V97	1	-	1	0,1	-	0,0
Druge in neopredeljene transportne nezgode	V98-V99	1	-	1	0,1	-	0,0
Padci	W00-W19	292	388	680	28,5	37,3	32,9
Izpostavljenost neživim mehaničnim silam	W20-W49	14	4	18	1,4	0,4	0,9
Izpostavljenost živim mehaničnim silam	W50-W64	-	4	4	-	0,4	0,2
Naključna utopitev in potopitev	W65-W74	18	2	20	1,8	0,2	1,0
Druga naključna ogrožanja dihanja	W75-W84	13	19	32	1,3	1,8	1,5
Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju	W85-W99	1	-	1	0,1	-	0,0
Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom	X00-X09	8	2	10	0,8	0,2	0,5
Stik z vročino in vročimi snovmi	X10-X19	2	-	2	0,2	-	0,1
Stik s strupenimi živalmi in rastlinami	X20-X29	1	-	1	0,1	-	0,0
Izpostavljenost naravnim silam	X30-X39	10	3	13	1,0	0,3	0,6
Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi	X40-X49	44	11	55	4,3	1,1	2,7
Namerna samopoškodba	X60-X84	327	84	411	31,9	8,1	19,9
Napad	X85-Y09	15	8	23	1,5	0,8	1,1
Dogodek nedoločenega namena	Y10-Y34	15	8	23	1,5	0,8	1,1
Zakonito posredovanje in vojne operacije	Y35-Y36	1	-	1	0,1	-	0,0
Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljeni pri zdravljenju, ... <sup>2)</sup>	Y40-Y59	6	2	8	0,6	0,2	0,4
Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo	Y60-Y69	1	4	5	0,1	0,4	0,2
Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem	Y70-Y82	-	1	1	-	0,1	0,0
Kirurški, drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta, ... <sup>3)</sup>	Y83-Y84	40	37	77	3,9	3,6	3,7
Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolenosti in umrljivosti	Y85-Y89	23	11	34	2	1	2
<b>SKUPAJ</b>		<b>918</b>	<b>617</b>	<b>1.535</b>	<b>89,5</b>	<b>59,3</b>	<b>74,3</b>

<sup>1)</sup> Kategorije brez pojava niso prikazane.<sup>2)</sup> ki povzročajo škodljive učinke.<sup>3)</sup> kasnejši zaplet.


Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti




2.1 Slika 10: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik) po spolu, Slovenija, 2000–2017**



<sup>1)</sup> Kode X60-X84, X870 (MKB-10 klasifikacija).

Viri: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 12: **Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi padcev<sup>1)</sup> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2017**




<sup>1)</sup> Kode W00-W19 (MKB-10 klasifikacija).

Viri: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 11: **Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2017**

na 100.000 prebivalcev starostne skupine



<sup>1)</sup> Kode X60-X84, X870-W19 (MKB-10 klasifikacija).

Viri: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

V letu 2017 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 412 ljudi, 327 moških in 84 žensk. Stopnja umrljivosti zaradi samomora se je v zadnjih 10 letih znižala pri obeh spolih, nekoliko izraziteje pri moških.

Z daljšanjem življenjske dobe se povečuje tudi število poškodb v višji starosti. Poškodbe so pretežno posledice padcev, zato so ti v zadnjih letih postali vzrok za največji delež smrti pri nezgodah. V letu 2017 je zaradi posledic padcev umrlo 680 ljudi, 292 moških in 388 žensk.



## REGIONALNE PRIMERJAVE

2.1 Tabela 8: **Umrli in stopnja umrljivosti** po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjoslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
<b>Število umrlih</b>														
SKUPAJ	Moški	665	1.777	345	1.332	303	405	731	2.183	963	262	644	526	10.136
	Ženske	711	1.767	344	1.311	334	407	733	2.321	962	295	666	522	10.373
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.376</b>	<b>3.544</b>	<b>689</b>	<b>2.643</b>	<b>637</b>	<b>812</b>	<b>1.464</b>	<b>4.504</b>	<b>1.925</b>	<b>557</b>	<b>1.310</b>	<b>1.048</b>	<b>20.509</b>	
0-64 let	Moški	166	424	79	353	79	100	177	509	212	50	143	106	2.398
	Ženske	80	223	37	137	31	44	81	254	125	16	65	48	1.141
<b>SKUPAJ</b>	<b>246</b>	<b>647</b>	<b>116</b>	<b>490</b>	<b>110</b>	<b>144</b>	<b>258</b>	<b>763</b>	<b>337</b>	<b>66</b>	<b>208</b>	<b>154</b>	<b>3.539</b>	
<b>Stopnja umrljivosti</b> na 100.000 prebivalcev														
SKUPAJ	Moški	1.171,9	1.111,6	971,7	1.040,6	1.071,8	1.068,9	1.014,7	824,1	954,0	985,9	1.093,4	933,3	987,9
	Ženske	1.214,1	1.093,7	974,2	1.031,4	1.152,2	1.084,4	1.036,8	842,5	936,1	1.135,8	1.132,3	909,6	997,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.193,4</b>	<b>1.102,6</b>	<b>972,9</b>	<b>1.036,0</b>	<b>1.112,5</b>	<b>1.076,6</b>	<b>1.025,6</b>	<b>833,5</b>	<b>945,0</b>	<b>1.060,0</b>	<b>1.112,9</b>	<b>921,4</b>	<b>992,6</b>	
0-64 let	Moški	355,2	318,6	267,1	326,7	335,0	316,3	288,9	226,6	251,2	226,6	296,6	227,5	278,9
	Ženske	180,1	179,3	134,0	137,0	138,5	151,7	144,7	116,2	156,4	79,8	146,7	109,0	140,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>269,8</b>	<b>251,3</b>	<b>202,8</b>	<b>235,5</b>	<b>239,3</b>	<b>237,5</b>	<b>220,0</b>	<b>172,2</b>	<b>205,1</b>	<b>156,7</b>	<b>224,8</b>	<b>169,9</b>	<b>211,8</b>	
<b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> na 100.000 prebivalcev														
SKUPAJ	Moški	815,3	781,7	671,2	783,0	770,5	744,3	760,4	602,4	652,6	643,0	703,3	616,1	700,9
	Ženske	470,9	458,1	415,7	448,1	445,6	430,2	441,3	368,7	394,0	406,1	384,1	347,2	412,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>620,5</b>	<b>596,2</b>	<b>526,4</b>	<b>596,3</b>	<b>582,8</b>	<b>574,0</b>	<b>583,1</b>	<b>471,2</b>	<b>504,9</b>	<b>511,9</b>	<b>527,4</b>	<b>462,7</b>	<b>538,9</b>	
0-64 let	Moški	245,7	238,7	186,0	250,7	246,8	233,3	231,6	193,5	205,3	166,5	228,6	169,9	217,9
	Ženske	125,9	131,4	97,8	103,5	99,2	111,7	117,4	96,8	119,0	60,9	106,2	80,7	107,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>186,8</b>	<b>186,0</b>	<b>142,9</b>	<b>178,7</b>	<b>172,9</b>	<b>174,3</b>	<b>176,1</b>	<b>145,0</b>	<b>162,4</b>	<b>116,0</b>	<b>169,7</b>	<b>126,1</b>	<b>163,6</b>	


Vir:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 13: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti** po statističnih regijah, Slovenija, 2017

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev



© NIJZ

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

Prezgodnja umrljivost je v letu 2017 najvišja v pomurski in najnižja v obalno-kraški regiji.


2.1 Tabela 9: **Umrli po starostnih skupinah**, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
0-9 let	Moški	-	2	-	3	2	1	5	6	4	-	1	2	26
	Ženske	1	4	-	2	1	2	3	12	2	1	-	-	28
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>54</b>
10-19	Moški	-	2	-	2	-	-	3	5	2	1	1	1	17
	Ženske	1	2	-	1	-	-	3	3	1	-	-	1	12
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	-	-	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
20-29	Moški	4	10	1	10	2	2	5	19	7	1	9	2	72
	Ženske	1	1	1	6	-	-	2	9	1	1	3	1	26
	<b>SKUPAJ</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>98</b>
30-39	Moški	5	21	2	16	5	3	13	30	10	4	9	5	123
	Ženske	2	10	3	4	4	1	7	9	3	-	2	1	46
	<b>SKUPAJ</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>169</b>
40-49	Moški	19	43	10	36	7	10	18	66	23	3	20	17	272
	Ženske	6	34	5	13	4	5	9	30	17	1	9	10	143
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>96</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>415</b>
50-59	Moški	63	179	35	153	35	47	60	188	79	18	54	37	948
	Ženske	40	83	15	62	12	18	34	87	51	5	22	19	448
	<b>SKUPAJ</b>	<b>103</b>	<b>262</b>	<b>50</b>	<b>215</b>	<b>47</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>275</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>76</b>	<b>56</b>	<b>1.396</b>
60-69	Moški	154	355	61	277	57	99	162	408	182	56	117	104	2.032
	Ženske	71	196	28	124	28	40	62	227	97	23	53	42	991
	<b>SKUPAJ</b>	<b>225</b>	<b>551</b>	<b>89</b>	<b>401</b>	<b>85</b>	<b>139</b>	<b>224</b>	<b>635</b>	<b>279</b>	<b>79</b>	<b>170</b>	<b>146</b>	<b>3.023</b>
70-79	Moški	203	496	97	356	80	98	187	523	243	50	150	120	2.603
	Ženske	110	324	71	251	59	63	121	378	176	49	89	91	1.782
	<b>SKUPAJ</b>	<b>313</b>	<b>820</b>	<b>168</b>	<b>607</b>	<b>139</b>	<b>161</b>	<b>308</b>	<b>901</b>	<b>419</b>	<b>99</b>	<b>239</b>	<b>211</b>	<b>4.385</b>
80-89	Moški	171	543	116	395	87	112	235	729	321	95	213	197	3.214
	Ženske	310	733	150	555	139	177	331	956	383	119	280	206	4.339
	<b>SKUPAJ</b>	<b>481</b>	<b>1.276</b>	<b>266</b>	<b>950</b>	<b>226</b>	<b>289</b>	<b>566</b>	<b>1.685</b>	<b>704</b>	<b>214</b>	<b>493</b>	<b>403</b>	<b>7.553</b>
90+	Moški	46	126	23	84	28	33	43	209	92	34	70	41	829
	Ženske	169	380	71	293	87	101	161	610	231	96	208	151	2.558
	<b>SKUPAJ</b>	<b>215</b>	<b>506</b>	<b>94</b>	<b>377</b>	<b>115</b>	<b>134</b>	<b>204</b>	<b>819</b>	<b>323</b>	<b>130</b>	<b>278</b>	<b>192</b>	<b>3.387</b>

Vir: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 14: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti** zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavijih MKB-10 in statističnih regijah, Slovenija, 2017

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev

**Bolezni obtočil (I00-I99)**


SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev

**Neoplazme (C00-D48)**

Vir: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

Vir: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev

**Zunanji vzroki obolenosti in umrljivost (V01-Y98)**

Vir: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 10: **Umrli po poglavjih MKB-10**, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017

<b>Poglavlje MKB-10</b>				<i>Pomurska</i>	<i>Podravska</i>	<i>Koroška</i>	<i>Savinjska</i>	<i>Zasavska</i>	<i>Posavska</i>	<i>Jugovzhodna Slovenija</i>	<i>Osrednjeslovenska</i>	<i>Gorenjska</i>	<i>Primorsko-notranjska</i>	<i>Goriška</i>	<i>Obalno-kraška</i>	<b>SLOVENIJA</b>	
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00-B99		M	1	7	2	8	1	3	2	11	2	-	1	3	41
				Ž	5	8	4	6	5	3	4	20	10	3	3	1	72
			<b>SKUPAJ</b>		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>113</b>
II.	Neoplazme	C00-D48		M	215	600	125	442	118	136	262	828	356	83	217	155	3.537
				Ž	181	483	100	318	93	91	185	685	302	69	172	145	2.824
			<b>SKUPAJ</b>		<b>396</b>	<b>1.083</b>	<b>225</b>	<b>760</b>	<b>211</b>	<b>227</b>	<b>447</b>	<b>1.513</b>	<b>658</b>	<b>152</b>	<b>389</b>	<b>300</b>	<b>6.361</b>
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89		M	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	7
				Ž	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	3	-	10
			<b>SKUPAJ</b>		-	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E90		M	10	24	9	31	5	4	16	45	21	3	8	6	182
				Ž	18	31	6	28	8	9	13	55	14	3	12	8	205
			<b>SKUPAJ</b>		<b>28</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>387</b>
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99		M	24	51	9	38	13	14	28	49	32	8	18	14	298
				Ž	6	16	4	9	2	3	9	14	6	-	-	1	70
			<b>SKUPAJ</b>		<b>30</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>368</b>
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99		M	15	46	12	29	7	11	15	68	36	10	17	21	287
				Ž	15	55	9	35	7	13	29	81	42	8	26	13	333
			<b>SKUPAJ</b>		<b>30</b>	<b>101</b>	<b>21</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>149</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>620</b>
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>SKUPAJ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H59		M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>SKUPAJ</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

		Poglavlje MKB-10		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjoslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	
				M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99		252	602	107	427	93	130	217	672	294	97	224	187	3.302	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž		
			<b>SKUPAJ</b>	<b>597</b>	<b>1.404</b>	<b>262</b>	<b>1.038</b>	<b>237</b>	<b>326</b>	<b>530</b>	<b>1.697</b>	<b>692</b>	<b>252</b>	<b>539</b>	<b>430</b>	<b>8.004</b>	
X.	Bolezni dihal	J00-J99		32	118	25	92	10	24	46	110	60	20	44	47	628	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	652	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>76</b>	<b>222</b>	<b>48</b>	<b>196</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>94</b>	<b>249</b>	<b>112</b>	<b>38</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>1.280</b>	
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93		41	104	14	84	8	24	41	83	45	12	28	24	508	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	404	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>57</b>	<b>185</b>	<b>30</b>	<b>145</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>157</b>	<b>89</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>912</b>	
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99		1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	5	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99		1	2	-	1	-	1	2	4	3	1	3	2	20	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	59	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>79</b>	
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99		6	12	6	14	3	7	6	11	5	5	6	6	87	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	190	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>277</b>	
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	-	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
XVI.	Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96		-	1	-	2	1	-	1	4	-	-	1	1	11	
				■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	■ M	■ Ž	13	
			<b>SKUPAJ</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjestenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	
		Poglavlje MKB-10	M													
XVII.	Prijetjene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00-Q99	M	-	1	1	2	-	1	1	7	2	1	-	3	19
			Ž	2	2	-	3	-	1	4	4	-	-	3	-	19
		<b>SKUPAJ</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	-	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>38</b>
XVIII	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi neuvrščeni drugje	R00-R99	M	20	45	5	25	6	15	24	83	25	6	15	17	286
			Ž	31	44	1	17	5	9	31	36	9	2	1	12	198
		<b>SKUPAJ</b>		<b>51</b>	<b>89</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>119</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>484</b>
XX.	Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti	V01-Y98	M	47	159	30	136	37	35	70	206	81	16	62	39	918
			Ž	30	108	19	70	24	23	52	130	59	24	49	29	617
		<b>SKUPAJ</b>		<b>77</b>	<b>267</b>	<b>49</b>	<b>206</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>122</b>	<b>336</b>	<b>140</b>	<b>40</b>	<b>111</b>	<b>68</b>	<b>1.535</b>
		<b>SKUPAJ poglavja MKB-10</b>	M	<b>665</b>	<b>1.777</b>	<b>345</b>	<b>1.332</b>	<b>303</b>	<b>405</b>	<b>731</b>	<b>2.183</b>	<b>963</b>	<b>262</b>	<b>644</b>	<b>526</b>	<b>10.136</b>
			Ž	<b>711</b>	<b>1.767</b>	<b>344</b>	<b>1.311</b>	<b>334</b>	<b>407</b>	<b>733</b>	<b>2.321</b>	<b>962</b>	<b>295</b>	<b>666</b>	<b>522</b>	<b>10.373</b>
		<b>SKUPAJ</b>		<b>1.376</b>	<b>3.544</b>	<b>689</b>	<b>2.643</b>	<b>637</b>	<b>812</b>	<b>1.464</b>	<b>4.504</b>	<b>1.925</b>	<b>557</b>	<b>1.310</b>	<b>1.048</b>	<b>20.509</b>

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti



2.1 Tabela 11: Stopnja umrljivosti po poglavjih MKB-10, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017

na 100.000 prebivalcev

Poglavje MKB-10			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjoslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00-B99	M Ž	1,8 8,5	4,4 5,0	5,6 11,3	6,2 4,7	3,5 17,2	7,9 8,0	2,8 5,7	4,2 7,3	2,0 9,7	- 11,6	1,7 2,5	5,3 1,7	4,0 6,9
		<b>SKUPAJ</b>		<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>8,5</b>	<b>5,5</b>	<b>10,5</b>	<b>8,0</b>	<b>4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>
II.	Neoplazme	C00-D48	M Ž	378,9 309,1	375,3 299,0	352,1 283,2	345,3 250,2	417,4 320,8	359,0 242,4	363,7 261,7	312,6 248,6	352,7 293,9	312,3 265,7	368,4 292,4	275,0 252,7	344,7 271,5
		<b>SKUPAJ</b>		<b>343,4</b>	<b>336,9</b>	<b>317,7</b>	<b>297,9</b>	<b>368,5</b>	<b>301,0</b>	<b>313,2</b>	<b>280,0</b>	<b>323,0</b>	<b>289,3</b>	<b>330,5</b>	<b>263,7</b>	<b>307,9</b>
III.	Bolezni krvi in org. ter imunski odziv	D50-D89	M Ž	- -	1,9 1,2	- 2,8	- -	- -	- -	- 1,4	0,8 0,7	1,0 -	- 3,9	- 5,1	1,8 0,9	0,7 0,8
		<b>SKUPAJ</b>		-	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E90	M Ž	17,6 30,7	15,0 19,2	25,3 17,0	24,2 22,0	17,7 27,6	10,6 24,0	22,2 18,4	17,0 20,0	20,8 13,6	11,3 11,6	13,6 20,4	10,6 13,9	17,7 19,7
		<b>SKUPAJ</b>		<b>24,3</b>	<b>17,1</b>	<b>21,2</b>	<b>23,1</b>	<b>22,7</b>	<b>17,2</b>	<b>20,3</b>	<b>18,5</b>	<b>17,2</b>	<b>11,4</b>	<b>17,0</b>	<b>12,3</b>	<b>18,7</b>
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	M Ž	42,3 10,2	31,9 9,9	25,3 11,3	29,7 7,1	46,0 6,9	37,0 8,0	38,9 12,7	18,5 5,1	31,7 5,8	30,1 -	30,6 -	24,8 1,7	29,0 6,7
		<b>SKUPAJ</b>		26,0	20,8	18,4	18,4	26,2	22,5	25,9	11,7	18,7	15,2	15,3	13,2	17,8
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	M Ž	26,4 25,6	28,8 34,0	33,8 25,5	22,7 27,5	24,8 24,1	29,0 34,6	20,8 41,0	25,7 29,4	35,7 40,9	37,6 30,8	28,9 44,2	37,3 22,7	28,0 32,0
		<b>SKUPAJ</b>		<b>26,0</b>	<b>31,4</b>	<b>29,7</b>	<b>25,1</b>	<b>24,5</b>	<b>31,8</b>	<b>30,8</b>	<b>27,6</b>	<b>38,3</b>	<b>34,3</b>	<b>36,5</b>	<b>29,9</b>	<b>30,0</b>
VII.	Bolezni očesa in H00-H59		M Ž	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
		<b>SKUPAJ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida H60-H59		M Ž	- -	- -	- -	0,8 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,1 -	
		<b>SKUPAJ</b>		-	-	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>	

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

na 100.000 prebivalcev

Poglavlje MKB-10			Pomurska	Podrska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjoslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
IX. Bolezni obtočil	I00-I99	M Ž	444,1 589,1	376,6 496,4	301,4 439,0	333,6 480,7	329,0 496,8	343,1 522,2	301,2 442,7	253,7 372,1	291,3 387,3	365,0 596,8	380,3 535,6	331,8 423,4	321,8 452,0
	<b>SKUPAJ</b>		<b>517,8</b>	<b>436,8</b>	<b>370,0</b>	<b>406,9</b>	<b>413,9</b>	<b>432,2</b>	<b>371,3</b>	<b>314,0</b>	<b>339,7</b>	<b>479,6</b>	<b>457,9</b>	<b>378,0</b>	<b>387,4</b>
X. Bolezni dihal	J00-J99	M Ž	56,4 75,1	73,8 64,4	70,4 65,1	71,9 81,8	35,4 106,9	63,3 48,0	63,9 67,9	41,5 50,5	59,4 50,6	75,3 69,3	74,7 68,0	83,4 54,0	61,2 62,7
	<b>SKUPAJ</b>		<b>65,9</b>	<b>69,1</b>	<b>67,8</b>	<b>76,8</b>	<b>71,6</b>	<b>55,7</b>	<b>65,9</b>	<b>46,1</b>	<b>55,0</b>	<b>72,3</b>	<b>71,4</b>	<b>68,6</b>	<b>62,0</b>
XI. Bolezni prebavil	K00-K93	M Ž	72,3 27,3	65,1 50,1	39,4 45,3	65,6 48,0	28,3 31,0	63,3 61,3	56,9 41,0	31,3 26,9	44,6 42,8	45,2 11,6	47,5 39,1	42,6 43,6	49,5 38,8
	<b>SKUPAJ</b>		<b>49,4</b>	<b>57,6</b>	<b>42,4</b>	<b>56,8</b>	<b>29,7</b>	<b>62,3</b>	<b>49,0</b>	<b>29,1</b>	<b>43,7</b>	<b>28,5</b>	<b>43,3</b>	<b>43,1</b>	<b>44,1</b>
XII. Bolezni kože in podkožja	L00-L99	M Ž	1,8 -	1,3 -	- -	- -	3,5 0,8	- -	- -	- 1,1	- -	- 3,9	- 1,9	- -	0,4 0,5
	<b>SKUPAJ</b>		<b>0,9</b>	<b>0,6</b>			<b>0,4</b>	<b>1,7</b>			<b>0,6</b>		<b>1,9</b>		<b>0,4</b>
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva	M00-M99	M Ž	1,8 10,2	1,3 3,7	- -	0,8 5,5	- 3,4	2,6 5,3	2,8 5,7	1,5 5,4	3,0 4,9	3,8 15,4	5,1 8,5	3,5 7,0	1,9 5,7
	<b>SKUPAJ</b>		<b>6,1</b>	<b>2,5</b>		<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>9,5</b>	<b>6,8</b>	<b>5,3</b>	<b>3,8</b>
XIV. Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	M Ž	10,6 20,5	7,5 14,2	16,9 17,0	10,9 32,3	10,6 17,2	18,5 40,0	8,3 14,1	4,2 10,5	5,0 20,4	18,8 15,4	10,2 23,8	10,6 17,4	8,5 18,3
	<b>SKUPAJ</b>		<b>15,6</b>	<b>10,9</b>	<b>16,9</b>	<b>21,6</b>	<b>14,0</b>	<b>29,2</b>	<b>11,2</b>	<b>7,4</b>	<b>12,8</b>	<b>17,1</b>	<b>17,0</b>	<b>14,1</b>	<b>13,4</b>
XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	M Ž	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-						
	<b>SKUPAJ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	M Ž	- -	0,6 1,2	- -	1,6 -	3,5 -	- 2,7	1,4 1,4	1,5 3,3	- -	- -	1,7 -	1,8 -	1,1 1,2
	<b>SKUPAJ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

na 100.000 prebivalcev

Poglavlje MKB-10		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjoslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	
		M													
XVII. Prirojene malfor., defor., in kromos. nenorm.	Q00-Q99	-	0,6	2,8	1,6	-	2,6	1,4	2,6	2,0	3,8	-	5,3	1,9	
		Ž	3,4	1,2	-	2,4	-	2,7	5,7	1,5	-	5,1	-	1,8	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	
XVIII. Simptomi, znaki, nenorm. izvidi, neuvrščeni drugje	R00-R99	35,2	28,1	14,1	19,5	21,2	39,6	33,3	31,3	24,8	22,6	25,5	30,2	27,9	
		Ž	52,9	27,2	2,8	13,4	17,2	24,0	43,8	13,1	8,8	7,7	1,7	20,9	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>44,2</b>	<b>27,7</b>	<b>8,5</b>	<b>16,5</b>	<b>19,2</b>	<b>31,8</b>	<b>38,5</b>	<b>22,0</b>	<b>16,7</b>	<b>15,2</b>	<b>13,6</b>	<b>25,5</b>	<b>23,4</b>	
XX. Zunanji vzroki obolev. in umrljivosti	V01-Y98	82,8	99,5	84,5	106,2	130,9	92,4	97,2	77,8	80,2	60,2	105,3	69,2	89,5	
		Ž	51,2	66,8	53,8	55,1	82,8	61,3	73,6	47,2	57,4	92,4	83,3	50,5	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>66,8</b>	<b>83,1</b>	<b>69,2</b>	<b>80,7</b>	<b>106,5</b>	<b>76,9</b>	<b>85,5</b>	<b>62,2</b>	<b>68,7</b>	<b>76,1</b>	<b>94,3</b>	<b>59,8</b>	<b>74,3</b>	
<b>SKUPAJ poglavja MKB-</b>		<b>M</b>	<b>1.171,9</b>	<b>1.111,6</b>	<b>971,7</b>	<b>1.040,6</b>	<b>1.071,8</b>	<b>1.068,9</b>	<b>1.014,7</b>	<b>824,1</b>	<b>954,0</b>	<b>985,9</b>	<b>1.093,4</b>	<b>933,3</b>	<b>987,9</b>
		<b>Ž</b>	<b>1.214,1</b>	<b>1.093,7</b>	<b>974,2</b>	<b>1.031,4</b>	<b>1.152,2</b>	<b>1.084,4</b>	<b>1.036,8</b>	<b>842,5</b>	<b>936,1</b>	<b>1.135,8</b>	<b>1.132,3</b>	<b>909,6</b>	<b>997,2</b>
	<b>SKUPAJ</b>		<b>1.193,4</b>	<b>1.102,6</b>	<b>972,9</b>	<b>1.036,0</b>	<b>1.112,5</b>	<b>1.076,6</b>	<b>1.025,6</b>	<b>833,5</b>	<b>945,0</b>	<b>1.060,0</b>	<b>1.112,9</b>	<b>921,4</b>	<b>992,6</b>


Vir:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Slika 15: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil** po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2008–2017


SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev



Vir: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti



2.1 Slika 16: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi neoplazem po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2008–2017



Vir: Obrazec Prijava smrti (DEM-2) in Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

© NIJZ

2.1 Tabela 12: **Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti<sup>1)</sup> (MKB-10, poglavje XX), po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017**

na 100.000 prebivalcev

	<b>Moški</b>	<b>Ženske</b>	<b>SKUPAJ</b>
Zasavska	130,9	82,8	106,5
Goriška	105,3	83,3	94,3
Jugovzhodna Slovenija	97,2	73,6	85,5
Podravska	99,5	66,8	83,1
Savinjska	106,2	55,1	80,7
Posavska	92,4	61,3	76,9
Primorsko-notranjska	60,2	92,4	76,1
<b>SLOVENIJA</b>	<b>89,5</b>	<b>59,3</b>	<b>74,3</b>
Koroška	84,5	53,8	69,2
Gorenjska	80,2	57,4	68,7
Pomurska	82,8	51,2	66,8
Osrednjeslovenska	77,8	47,2	62,2
Obalno-kraška	69,2	50,5	59,8


© NIJZ

<sup>1)</sup> Kode V01-Y98 (MKB-10 klasifikacija)

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

2.1 Tabela 13: Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017

<sup>1)</sup> Kode X60-X84, X870 (MKB-10 klasifikacija).

Viri:

Obrazec Prijava smrti (DEM-2)

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti

Samomori so pogostejši v severovzhodnih predelih Slovenije, medtem ko jih je v regijah na zahodu države manj. Tako v razvitih državah kot tudi v Sloveniji je samomor med moškimi pogostejši kot pri ženskah.



## MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.1 Tabela 14: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti po spolu**, Slovenija in EU, 2006–2015

SSS na 100.000 prebivalcev

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Slovenija</b>										
Moški	921,0	905,8	844,3	830,3	800,1	774,9	763,9	748,1	697,7	717,3
Ženske	502,1	493,7	472,0	469,2	448,4	442,4	443,7	428,4	409,5	420,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>680,5</b>	<b>668,7</b>	<b>631,9</b>	<b>625,1</b>	<b>599,7</b>	<b>585,4</b>	<b>582,2</b>	<b>569,2</b>	<b>536,3</b>	<b>552,2</b>
<b>EU</b>										
Moški	829,7	815,3	797,2	780,8	761,0	738,2	734,4	722,7	699,1	708,9
Ženske	500,5	491,7	484,2	473,6	462,9	451,5	452,4	444,5	430,6	441,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>645,1</b>	<b>634,3</b>	<b>622,5</b>	<b>609,4</b>	<b>595,0</b>	<b>578,8</b>	<b>577,9</b>	<b>568,0</b>	<b>550,1</b>	<b>561,0</b>


Viri:

WHO European Data Warehouse, [https://dw.euro.who.int/api/v3/export?code=HFAMDB\\_113](https://dw.euro.who.int/api/v3/export?code=HFAMDB_113), 19. 11. 2018



2.1 Slika 17: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija in nekatere evropske države, 2015**

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev



© NIJZ

Viri: WHO European Data Warehouse, <https://dw.euro.who.int>, 8. 11. 2018



## DEFINICIJE

---

Okrajšave in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
	<b>Umrli</b>	Umrli je oseba, pri kateri so kadar koli, potem ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenske funkcije.	Podatki o umrlih beležijo umrle s stalnim prebivališčem v RS, ki so umrli od 1. januarja do 31. decembra v opazovanem koledarskem letu. V RS smrt potrdijo in vzroke smrti ugotavljajo samo zdravniki. Ob mrliskem pregledu so dolžni izpisati Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzrokih smrti na način, ki ga je predpisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: <a href="http://www.nijz.si/">http://www.nijz.si/</a>	Deceased / Dead person
	<b>Vzroki smrti</b>	Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročile smrt ali so privedle do smrti, in okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe. Vzroke smrti se kodira po enotni doktrini, predpisani v deseti reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10).	Osnovni vzrok smrti je/so: - bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti, ali - okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile poškodbo, zaradi katere je oseba umrla.	Causes of death



Okrajšave in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
MKB-10	<b>Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, X. revizija</b>	MKB je klasifikacija bolezni, kot jih razvršča WHO. Klasifikacija bolezni je sistem kategorij, v katerega so bolezni in stanja uvrščeni v skladu z izbranimi merili. S pomočjo MKB lahko diagnoze bolezni in drugih zdravstvenih težav prevedemo iz besednega opisa v črkovno-številčne kode. Po letu 1996 so vzroki smrti razvrščeni po MKB-10.	MKB-10 je razdeljena na 21 poglavij. Prvi znak vsake kode je črka in vsaka črka je povezana z določenim poglavjem, razen črke D (poglavlji II in III) in črke H (poglavlji VII in VIII). V štirih poglavjih (I, II, XIX in XX) se na prvem mestu kod pojavlja več različnih črk. Črki sledi trimestrna kategorija (ali štirimestna podkategorija) številskega znaka.  Poglavia I do XVII se nanašajo na bolezni in druga bolezenska stanja, poglavje XIX pa na poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov. V poglavju XVIII so simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje, v poglavju XX so zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti, v poglavju XXI pa dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stike z zdravstveno službo.	ICD-10, International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision
	<b>Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti</b>	Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti so okoliščine ali nasilje, ki je povzročilo poškodbo (ali stanje), zaradi katere je oseba umrla.	Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti se od MKB-9 dalje lahko dodatno kodirajo tudi k drugim boleznim in bolezenskim stanjem, ne samo k poškodbam in zastrupitvam, kot so se morali pri vseh prejšnjih revizijah. Zato je vzrok smrti v poglavju XIX manj kot zunanjih vzrokov v poglavju XX.	External causes of mortality
	<b>Nasilna smrt</b>	Nasilna smrt je tista, ki je posledica nezgode (vse vrste prometnih nezgod, naključni padci, utopitve, nesreče z ognjem, orožjem itd.), samomora ali uboja.	Nasilna smrt je posledica delovanja različnih zunanjih dejavnikov.	Violent death



Okrajšave in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
	<b>Samomor</b>	Samomor ali suicid je dejanje, s katerim človek sam namerno povzroči svojo smrt oziroma si vzame življenje.		Suicide
<b>SSS</b>	<b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b>	Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (angleško "standardized death rate" – SDR) je metoda direktnе standardizacije, kjer se izračun stopnje umrljivosti na 100.000 prebivalcev, razdeljen po petletnih starostnih skupinah, umeri s preračunom na standardno populacijo, kar iznīči razlike v populaciji glede starosti prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija. Ta postopek omogoči neposredno primerjavo stopenj umrljivosti po posameznih državah, ne glede na razlike v starostni strukturi prebivalstva posamezne države.	Pri izračunu SDR se uporablja Evropska standardna populacija (ESP) Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1976 (100.000 prebivalcev, razdeljenih po petletnih starostnih skupinah, razen delitve 0–5 let na 0 let, 1–4 let starosti, enotno za oba spola). Več informacij o Evropski standardni populaciji je dostopnih na spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije: <a href="http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/WHO-Standard-Popuation.pdf">http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/WHO-Standard-Popuation.pdf</a>	Standardized death rate
	<b>Stopnja umrljivosti</b>	Stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 100.000.	Stopnja umrljivosti = (število umrlih x 100.000) / število prebivalcev	Death rate
<b>MS</b>	<b>Mediana starosti ob smrti</b>	Mediana starosti ob smrti predstavlja srednjo vrednost starosti ob smrti, od katere ima polovica umrlih nižjo in polovica umrlih višjo vrednost starosti ob smrti.	Mediana starosti ob smrti = srednja vrednost starosti umrlih ob smrti	Median age at death
	<b>Umrli dojenček</b>	Umrli dojenček je otrok, pri katerem so, kadar kolikor potem ko je bil živoroden, trajno prenehale vse življenske funkcije in še ni dopolnil enega leta starosti.	Dodatna metodološka pojasnila na spletni strani NIJZ: <a href="http://www.nijz.si/">http://www.nijz.si/</a>	Infant death



Okrajšave in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
	<b>Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih</b>	Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (0–365 dni) in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Umrljivost dojenčkov = (število umrlih dojenčkov x 1.000) / število živorojenih otrok	Infant mortality or infant deaths per 1000 live births
	<b>Starostno specifična stopnja umrljivosti</b>	Starostno specifična stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih določene starosti v koledarskem letu in številom prebivalstva enake starosti sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 100.000.	Starostno specifična stopnja umrljivosti = (število umrlih oseb določene starosti x 100.000) / število prebivalcev iste starosti	Age-specific mortality rate
	<b>Prezgodnja umrljivost</b>	Prezgodnja umrljivost je opredeljena kot smrt oseb, ki umrejo v starosti pred dogovorjeno mejo 65 let.	Starostna meja za prezgodnjo smrt je 64,99 let in je določena dogovorno. Stopnje so izračunane na 100.000 prebivalcev, starih od 0 do 64,99 let.	Premature mortality
	<b>Samomorilni količnik</b>	Je razmerje med številom umrlih zaradi samomora v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 100.000.  Pri izračunu umrljivosti zaradi samomora so upoštevane kode X60-X84, X870 ICD-10 klasifikacije.	(Število umrlih zaradi samomora / število prebivalcev) * 100.000	Suicide rate



## SEZNAM SLIK IN TABEL

---

### SEZNAM SLIK

2.1 Slika 1: <b>Vodilna vzroka smrti po spolu</b> , Slovenija, 2008–2017.....	2-2
2.1 Slika 2: <b>Umrli in povprečna starost umrlih</b> , Slovenija, 2017 .....	2-3
2.1 Slika 3: <b>Povprečna starost ob smrti</b> po spolu, Slovenija, 1988–2017 .....	2-3
2.1 Slika 4: <b>Povprečna starost ob smrti</b> po spolu, Slovenija, 1997 in odmik od 1988, 2007 in odmik od 1998 , 2017 in odmik 2008 .....	2-3
2.1 Slika 5: <b>Umrli dojenčki</b> po spolu, Slovenija, 1985–2017 .....	2-5
2.1 Slika 6: <b>Umrli 0–64 let (prezgodnja umrljivost)</b> , Slovenija, 2016.....	2-7
2.1 Slika 7: <b>Umrli 0–64 let</b> po spolu, Slovenija, 2008–2017 .....	2-7
2.1 Slika 8: <b>Vodilni vzroki smrti</b> po spolu, Slovenija, 2017 .....	2-9
2.1 Slika 9: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti</b> po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2008–2017 .....	2-10
2.1 Slika 10: <b>Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik)</b> po spolu, Slovenija, 2000–2017.....	2-12
2.1 Slika 11: <b>Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup></b> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2017 .....	2-12
2.1 Slika 12: <b>Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi padcev<sup>1)</sup></b> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2017 .....	2-12
2.1 Slika 13: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> po statističnih regijah, Slovenija, 2017.....	2-14
2.1 Slika 14: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in statističnih regijah, Slovenija, 2017.....	2-16
2.1 Slika 15: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2008–2017 .....	2-23
2.1 Slika 16: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi neoplazem</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2008–2017.....	2-24
2.1 Slika 17: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti</b> po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija in nekatere evropske države, 2015 .....	2-28



## SEZNAM TABEL

2.1 Tabela 1: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po spolu, Slovenija, 2008–2017 .....	2-4
2.1 Tabela 2: <b>Umrli dojenčki</b> po spolu, Slovenija, 2008–2017 .....	2-5
2.1 Tabela 3: <b>Umrli in starostno specifična stopnja umrljivosti</b> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2017 .....	2-6
2.1 Tabela 4: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po poglavijih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2017 .....	2-8
2.1 Tabela 5: <b>Umrli</b> po vrsti poškodbe, zastrupitve in nekaterih drugih posledic zunanjih vzrokov (MKB-10, poglavje XIX) in po spolu, Slovenija, 2017.....	2-9
2.1 Tabela 6: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavijih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2017.....	2-10
2.1 Tabela 7: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po zunanjih vzrokih obolenosti in umrljivost (MKB-10, poglavje XX) in spolu, Slovenija, 2017 .....	2-11
2.1 Tabela 8: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017.....	2-13
2.1 Tabela 9: <b>Umrli po starostnih skupinah</b> , spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017.....	2-15
2.1 Tabela 10: <b>Umrli po poglavijih MKB-10</b> , spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017 .....	2-17
2.1 Tabela 11: <b>Stopnja umrljivosti po poglavijih MKB-10</b> , spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017 .....	2-20
2.1 Tabela 12: <b>Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti<sup>1)</sup> (MKB-10, poglavje XX)</b> , po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017 .....	2-25
2.1 Tabela 13: <b>Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik)</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2017 .....	2-26
2.1 Tabela 14: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti po spolu</b> , Slovenija in EU, 2006–2015.....	2-27