


Cepljenje



steklina

pnevmokokne okužbe

rotavirusne okužbe



Cepljenje lisic proti steklini


- jesenska akcija cepljenja lisic poteka od 1. oktobra do predvidoma 15. novembra 2010
- vabe odmetavajo z letali, v bližini naselij ročno
- cepivo vsebuje živ oslavljen virus

Vaba za cepljenje lisic (kapsula s cepivom in zunanji ovoj)






Pomembno:

- **Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!**
 - Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
 - Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Tudi če na rokah ni vidnih ran, jih ob stiku z vsebino vabe dobro umijte z vodo in milom.
 - Ker se vsak stik z vabo obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma pokličite antirabično ambulanto na območnem ZZV.
 - Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
- 




Pnevmokokne okužbe

- pljučnica (90% bakterijskih pljučnic pri otrocih)
 - gnojni meningitis
 - bakteriemija, sepsa
 - vnetje srednjega ušesa (več kot 50% bakterijskih vnetij srednjega ušesa pri otrocih)
- 



Pnevmokok - način prenosa okužbe


- kapljično
 - bolnik ali klicenosec (med otroki do 2. leta starosti v kolektivnem varstvu je lahko klicenoscev do 70%)
- 



Pnevmokokne okužbe – zdravljenje in preprečevanje


Zdravljenje: antibiotiki

Preprečevanje:

- splošno - ukrepi za preprečevanje širjenja kapljičnih nalezljivih bolezni
 - specifično - **cepljenje**
- 




Kateri otroci so bolj ogroženi

- kronične bolezni pljuč, srca, ledvic, sladkorna bolezen
 - oslabljena imunost
 - okrnjeno delovanje vranice
 - polžev vsadek
 - izlivno vnetje srednjega ušesa v zadnjih mesecih
 - vključen v vrtec
 - starejši sorojenec v vrtcu ali šoli
 - v gospodinjstvu kdo kadi
- 



Rotavirusne okužbe

- rotavirusi pogosti povzročitelji akutnih okužb prebavil pri otrocih
 - okužbe pogostejše v zimskem času
 - zdravljenje ni specifično – najpomembnejše je nadomeščanje tekočine
 - pri malih otrocih zaradi dehidracije večkrat potrebna hospitalizacija
 - otrok ne sme v vrtec še najmanj 24 ur po zadnjem bruhanju ali odvajanju tekočega blata
- 



Cepljenje proti rotavirusnim okužbam

- opravljeno mora biti med 6 tednom in 6. mesecem starosti dojenčka
 - dve dozi, cepivo dobi dojenček v usta
- 