

CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK OKTOBER 2019

V mesecu **oktobru 2019** smo iz regije Celje prejeli **288 prijav*** nalezljivih bolezni. Stopnja obolevanja (**9.5/10 000 prebivalcev**) je bila nižja kot oktobra 2018 in nižja od petletnega povprečja (15.5/10 000 prebivalcev).

Incidenca ni presegla petletnega povprečja v nobeni upravni enoti. Najvišjo obolevnost smo zabeležili v UE Konjice (15.5/10 000 prebivalcev). Najnižjo stopnjo obolevnosti smo evidentirali v UE Šmarje (2.8/10 000 prebivalcev).

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **norice, herpes zoster, lymska borelijoza, streptokokni tonzilitis in drugi bakterijski enterokolitis.**

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V OKTOBRU 2019

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	OKTOBER 2018	POVPR. 2014-2018
DRUGI BAKT. ENTER. KAMPILOBAKTTERIOZA	3	2	2	2	1	2	2	-	1	2	17	15	15.2
SALMONELOZA	-	2	2	-	-	2	-	2	3	3	14	18	17.2
DRUGI VIRUS. ENTER. ŠIGELOZA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	5.4
ROTAVIROZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	23.4
ENTEROBIOZA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0.4
LAMBLIAZA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	8	6.0
NORICE	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	5	11	20.8
HERPES ZOSTER	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.6
STREPT. TONZILITIS	-	20	1	-	15	17	-	1	5	21	80	70	84.2
INF. MONONUKLEOZA	1	4	2	2	2	3	7	1	4	7	33	36	49.2
ŠKRLATINKA	4	1	-	-	-	1	2	-	11	10	29	98	81.8
STREPT. FARINGITIS	1	2	-	-	-	1	-	-	5	2	11	6	8.6
STREPT. PLJUČNICE	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	5	11	20.8
SEPSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32	19.4
ERYSIPEL - ŠEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	0.0
MIKROSPORIJA GARJE	-	4	1	3	-	-	1	-	-	4	13	12	16.6
LYMSKA BORELIOZA	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	5	8	19.2
KME	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	6	6	6.8
LEGIONELOZA	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	5	5	6.4
MENING. SEROZA	1	1	6	6	2	2	4	2	2	6	32	40	35.2
MENING. BAKT.	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	0	1.2
MENING. ZOSTER	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	5	2	1.6
ENCEF. ZOSTER	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	1.0
HEPATITIS B	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1.0
HEPATITIS C	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	0.0
LEPTOSPIROZA	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	5	1	0.8
TOKSOPLAZMOZA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	0.2
TETANUS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	0.0
SKUPAJ	10	50	19	18	21	36	24	9	38	63	288	420	468.2
MORBIDITETA/10 000	4.1	7.9	10.5	11.0	11.5	15.5	12.1	2.8	8.4	15.2	9.5	13.9	15.5

KAPLIČNO PRENOSLJIVE NALEZLJIVE BOLEZNI

Te nalezljive bolezni so predstavljale **55.9 %** vseh prijavljenih bolezni. Na prvem mestu so bile **norice**, ki so predstavljale **49.7 %** vseh prijavljenih bolezni iz te skupine. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v **UE Žalec** (9.4/10 000 prebivalcev).

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **12.8 %** vseh prijavljenih bolezni. Zabeležili smo **17 drugih bakterijskih enterokolitisov**, **14 kampilobakterioz**, **2 salmoneloz**, **2 druga virusna enterokolitisa**, **šigelozo** in **rotavirozo**.

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu oktobru smo zabeležili 32 primerov **lymske borelioze**, kar je manj kot oktobra 2018 in tudi manj od petletnega povprečja (35.2 bolnikov). Prejeli smo tri prijave klopnega meningoencefalitisa.

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

V oktobru smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje ARI in GPB prejeli **172 prijav ARI** (september 156 ARI).

Od drugih zdravstvenih služb smo prejeli še dodatnih **231 prijav ARI**, kar je več kot meseca septembra (135).

SEPSE

Prejeli smo **13** prijav sepse. Povzročitelji so bili *E. coli* (3), *S. pneumoniae* (3), *S. aureus* (3) in *L. monocytogenes* (1). Po enkrat so sepso povzročili streptokok B, druge vrste streptokok (A40.8) in drug opredeljen stafilokok (A41.1).

ANTIRABIČNA AMBULANTA

V oktobru smo v antirabični ambulanti obravnavali 8 oseb, ki so jih poškodovale živali in eno, ki je prišla v stik z vabo. Povzročitelji poškodb so bili psi (6-krat), mačka in podgana.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

Cepljenje odraslih proti pnevmokoknim okužbam

V sezoni cepljenja proti gripi je za starejše od 65 let, kronične bolnike in imunsko suprimirane bolnike priporočljivo cepljenje proti pnevmokoknim okužbam.

Priporočeno cepljenje je sestavljeno iz 13-val konjugiranega cepiva (PCV13) in 23-valentnega polisaharidnega cepiva (PPV23).

Za določene definirane bolnike je cepljenje krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za ostale pa je samoplačniško.

V primeru, da se cepljenje prične s PCV13 (Prevenar13), je potreben najmanj 8-tedenski razmik do cepljenja s PPV23 (Pneumovax). V primeru pa, da se cepljenje prične s PPV23, je potreben 1-letni razmik do cepljenja s PCV13. Za zelo malo bolnikov pride v poštev revakcinacija po petih letih s PPV23, za večino zadostuje enkratno cepljenje z obema cepivoma.

Več info je dostopnih na spletnem naslovu https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_pneumo_za_odrasle_in_otroke_nad_5_l_et_posodobljen_2019.pdf