

Priporočila za cepljenje proti opičjim kozam

- Na temelju razpoložljivih podatkov ter ocenjenih tveganj in koristi cepljenje splošnega prebivalstva proti opičjim kozam trenutno ni niti potrebno niti priporočljivo.
- V Sloveniji je proti opičjim kozam na voljo cepivo Jynneos, ki je namenjeno cepljenju oseb starih **18 let in več**.
- Cepljenje se opravi **subkutano**, z **dvema odmerkoma cepiva**, pripročen **presledek** med odmerkoma je **28 dni**. Za poekspozicijsko cepljenje zadostuje en odmerek.
- Cepljenje proti opičjim kozam opravljajo določene ambulante na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (OE Ljubljana, OE Maribor, OE Celje; <https://www.nijz.si/sl/ambulante>) in Cepilni center UKC LJ.

➤ **PREDEKSPOZICIJSKO CEPLJENJE**

- se priporoča laboratorijskim delavcem in zelo izpostavljenim zdravstvenim delavcem (npr. osebju, zaposlenemu v veneroloških ambulantah oz. ambulantah za spolno prenesene bolezni), ki imajo zaradi narave dela večje tveganje za stik z virusom opičjih koz

- se priporoča moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi in drugim osebami, ki imajo večje tveganje za izpostavljenost opičjim kozam, kot npr.: večje število spolnih partnerjev, udeleževanje na dogodkih, kjer prihaja do spolnih odnosov z večjim številom udeležencev, spolni odnosi z neznanci, spolno prenosljiva bakterijska okužba v zadnjem letu ali že prisotne spolno prenosljive okužbe v preteklosti, prejemanje predekspozicijske profilakse proti okužbi s HIV, uporaba kemseksa ...

➤ **POEKSPOZICIJSKO CEPLJENJE**

je smiselno izvesti čimprej, najbolje v štirih dneh (do največ 14 dni) po izpostavljenosti virusu.

Poekspozicijsko cepljenje je priporočljivo za:

- osebe, ki so bile v tesnem stiku* z obolelim, še posebej, če imajo večje tveganje za zaplete (osebe z oslabljenim imunskim sistemom, nosečnice),
- moške, ki imajo spolne odnose z moškimi in so bili v tesnem stiku z obolelim ali so bili v tesnem stiku s člani skupine, v kateri se je pojavil izbruh,
- zdravstvene oziroma laboratorijske delavce, izpostavljene virusu opičjih koz v primeru neustrezne zaščitne opreme ali nezgode.

* Opredelitev tesnega stika:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/monkeypox_bolniki_ver1.pdf