

## Priporočila za cepljenje proti covid-19 za različne skupine prebivalcev\*

Skupina prebivalcev		Priporočilo	Opombe
Otroci, stari od 6 mes.-4 leta	Zdravi	Osnovno cepljenje s tremi odmerki mRNA cepiva <b>za otroke, ki so v stiku z osebami z večjim tveganjem za težek potek covid-19</b> , ki jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.	
	Otroci s kroničnimi boleznimi	Osnovno cepljenje s tremi odmerki** mRNA cepiva.	
Otroci, stari 5-11 let	Zdravi	Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma mRNA cepiva <b>za otroke, ki so v stiku z osebami z večjim tveganjem za težek potek covid-19</b> , ki jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.	Osnovno cepljenje proti covid-19 je smiselno in varno tudi za ostale otroke, stare 5-11 let.
	Otroci s kroničnimi boleznimi	Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva.	
Mladostniki, stari 12-17 let	Zdravi	Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma mRNA cepiva ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega cepiva Nuvaxovid.	Lahko prejmejo tudi poživitveni odmerek, če tako želijo.
	Mladostniki s kroničnimi boleznimi	Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega cepiva Nuvaxovid <b>in en poživitveni odmerek#</b> mRNA cepiva.	
Odrasli, stari 18-59 let	Zdravi	Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma mRNA cepiva ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega cepiva Nuvaxovid <b>in en poživitveni odmerek#</b> mRNA cepiva.	Lahko prejmejo tudi drugi poživitveni oz. sezonski poživitveni odmerek, če tako želijo.
	Posebej ranljivi kronični bolniki	Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega cepiva Nuvaxovid <b>in dva poživitvena odmerka#</b> mRNA cepiva oz. <b>sezonski poživitveni odmerek</b> .	
Odrasli, stari 60 let ali več in oskrbovanci DSO/SVZ		Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega cepiva Nuvaxovid <b>in dva poživitvena odmerka#</b> mRNA cepiva oz. <b>sezonski poživitveni odmerek</b> .	

\* Prebolezniki naj prejmejo naslednji priporočen odmerek cepiva vsaj 3 mesece po zadnjem prebolelem covid-19.







\*\* Težje imunsko oslABLJENE osebe prejmejo osnovno cepljenje s tremi odmerki mRNA cepiva.

# Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom ter med poživitvenima odmerkoma je vsaj 3 mesece.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentu Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19 na naslednji povezavi:

<https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost>

## Cepiva proti covid-19 in njihova odobrena uporaba

Cepivo 		Uporaba 	Starostne skupine				Osnovno cepljenje - presledki
			6 m-4 leta	5-11 let	12-17 let	≥ 18 let	
Pfizer, BioNTech  <i>mRNA cepivo</i>	Comirnaty 3	osnovno cepljenje	✓				3 odmerki  3 tedni 8 tednov
	Comirnaty 10	osnovno cepljenje poživitveni odmerek <sup>#</sup>		✓ ✓			2 odmerka  3 tedni
	Comirnaty 30	osnovno cepljenje poživitveni odmerek <sup>#</sup>			✓ ✓	✓ ✓	
	Comirnaty Original /Omicron BA.1*	poživitveni odmerek <sup>#</sup>			✓	✓	
	Comirnaty Original /Omicron BA.4-5 (15/15 µg)*	poživitveni odmerek <sup>#</sup>			✓	✓	
	Comirnaty Original /Omicron BA.4-5 (5/5 µg)*	poživitveni odmerek <sup>#</sup>		✓			
Moderna  <i>mRNA cepivo</i>	Spikevax <sup>§</sup>	osnovno cepljenje  poživitveni odmerek <sup>#</sup>		✓ 6-11let 1/2 odm.	✓	✓	2 odmerka  4 tedni
	Spikevax bivalent Original /Omicron BA.1*	poživitveni odmerek <sup>#</sup>			✓	✓	
	Spikevax bivalent Original /Omicron BA.4-5*	poživitveni odmerek <sup>#</sup>			✓	✓	
Janssen Johnson&Johnson  <i>vektorsko cepivo</i>	Jcovden	osnovno cepljenje poživitveni odmerek <sup>#</sup>				✓ ✓	1 odmerek
Novavax  <i>proteinsko cepivo</i>	Nuvaxovid	osnovno cepljenje poživitveni odmerek <sup>#</sup>			✓	✓ ✓	2 odmerka  3 tedni

\* Prilagojena cepiva se glede na zaključke EMA lahko uporabijo tudi za osnovno cepljenje.

# Poživitveni odmerek lahko prejmejo osebe, pri katerih je minilo **vsaj 3 mesece** od zadnjega cepljenja ali prebolelega covid-19.

§ Pri osebah, mlajših od 30 let, je namesto cepiva Spikevax priporočljiva uporaba cepiva Comirnaty ali Nuvaxovid.

Cepljenje s cepivom proti covidu-19 in ostalimi cepivi se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.